


BILDTEIL


Tafeln I–LXII

Von den meisten Arten ist ein Beleg aus einer oder mehreren Fundstellen abgebildet. Wenn aufgrund schlechter Erhaltung die fotografische Abbildung nicht möglich war oder nicht sinnvoll erschien bzw. wenn Belegexemplare verschollen waren, wurde von mir im Rahmen dieser Arbeit verwendetes rezentes Vergleichsmaterial abgebildet.




Tafel I:

Abb. 1–6: *Theodoxus danubialis*; Abb. 1–3: Reisenbach bei Götzendorf (11. 7. 1894); Abb. 4–6: Mautern, Auxiliarkastell (Fnr. 96b 00 24), 2 mm. – Abb. 7–8: *Theodoxus transversalis*; Enzersdorf a. d. Fische (24. 7. 1983), 3 mm. – Abb. 9–10: *Cochlostoma septemspirale*; Nixloch (NL 86, I 13A1), 1 mm (9) bzw. 2 mm (10).




Tafel II:

Abb. 1–2: *Cochlostoma septemspirale*; Abri v. Elsbethen (Qu. 6hE2/1998), Mündung fragmentiert, 1 mm. –
 Abb. 3: *Cochlostoma septemspirale heydenianum*; Vindija, Kroatien (Juli 1994), 1 mm. – Abb. 4–6: *Cochlostoma*
cf. salomoni; Neudegg, Rotlehm, 2 mm (4, 5) bzw. 1 mm (6). – Abb. 7–8: *C. nouletii*; Pyrenäen (Naturhist.
 Museum Wien, coll. KLEMM, Nr. K 68710); zum Vergleich mit *C. cf. salomoni*, 2 mm. – Abb. 9–10: *Acicula*
lineata; Mariannenhöhle (8. 8. 1984), 1 mm.



Tafel III:

Abb. 1–4: *Platyla polita*; Abb. 1: Hinterbrühl, Schneckenklufft, 1 mm; Abb. 2: Hornsburg, Graben I (Probe 8), 1 mm; Abb. 3–4: Abri v. Elsbethen (Qu. 20IG1 97), 1 mm. Abb. 5: *Platyla gracilis*; Tscheppaschlucht (15. 9. 1990), 1 mm. – Abb. 6–8: *Renea veneta*; Abb. 6–7: Abri v. Elsbethen (Qu. 6hE2), 1 mm; Abb. 8: Hallstatt (5. 7. 1991). – Abb. 9–10: *Viviparus contectus*; bei Enzersdorf a. d. Fische (17. 7. 1983), 4 mm. – Abb. 11–12: *Viviparus acerosus*; Stempfelbach b. Hof a. d. March (2. 10. 1890), 5 mm.



Tafel IV:

Abb. 1–2: *Bithynia tentaculata* (2 = Operculum); Keutschacher See (Fnr. 53, zwischen Pfahl Nr. 24/27/28/30 u. 32), beide 1 mm. – Abb. 3–4: *Bithynia leachii*; Middelkerke, Chemin des Dunes (6. 8. 1976), 1 mm. – Abb. 5: *Bythiospeum* sp.; Große Badlhöhle (Kleinsäugerschicht), 1 mm. – Abb. 6: *Lithoglyphus naticoides*; Schloßhof a. d. March (19. 9. 1890), 2 mm. – Abb. 7–11: *Bythinella austriaca*; Abb. 7–8: Ramsaubach (30. 8. 1990), 1 mm; Abb. 9: Hohenberg, Steinbruch (SE 9), 1mm; Abb. 10: Lanzenkirchen (Fnr. 984), 1 mm; Abb. 11: Abri v. Elsbethen (Qu. 6hH5), 1 mm.




Tafel V:

Abb. 1–2: *Valvata cristata*; Abb. 1: Schloßhof a. d. March (25. 10. 1981), 1 mm; Abb. 2: Schletz (Fnr. 2525), 1 mm. – Abb. 3–4: *Valvata macrostoma*; Schloßhof a. d. March (25. 10. 1981), 1 mm. – Abb. 5–6: *Valvata piscinalis*; Maria Ellend (7. 2. 1982), 1 mm. – Abb. 7–8: *Valvata piscinalis antiqua*; Keutschacher See (Fnr. 53, zwischen Pfahl Nr. 24/27/28/30 u. 32), beide 2 mm. – Abb. 9–13: *Galba truncatula*; Abb. 9: Gumpoldskirchen, 1 mm; Abb. 10–11: Abri v. Elsbethen, inadult (Qu. 9hK2), 1 mm; Abb. 12: Lanzenkirchen (Fnr. 501), 1 mm; Abb. 13: Hohenberg, Steinbruch (SE 4), 1 mm.



Tafel VI:

Abb. 1: *Stagnicola turricula*; Drösing (25. 4. 1982), 2 mm. – Abb. 2–3: *Stagnicola corvus*; Jedlesee (6./9. 7. 1889), 5 mm. – Abb. 4–7: *Radix auricularia*; Abb. 4–5: Hohenberg, Steinbruch (SE 9), 3 mm; Abb. 6–7: Deutsch Altenburg (29. 6. 1982), 5 mm. – Abb. 8–10: *Radix ampla*; Deutsch Altenburg (29. 6. 1982), 4 mm.



Tafel VII:

Abb. 1: *Radix peregra*; Stillfried (Qu. F19, Fnr. 74/2666, Obj. 389, zw. Plan. 2 u. 3, Verf. 3, 1989), 1 mm. –
 Abb. 2–3: *Radix ovata*; Achau (14. 7. 1893), 4 mm. – Abb. 4–6: *Lymnaea stagnalis*; Abb. 4: Baumgarten (7.
 3. 1982), 3 mm; Abb. 5–6: Freudenauer Wasser/Lusthaus (8.–12. 10. 1891), 5 mm. – Abb. 7–8: *Aplexa*
hypnorum; Marchegg (15. 11. 1981), 2 mm. – Abb. 9–10: *Physa fontinalis*; Abb. 9: Middelkerke, Chemin des
 Dunes (6. 8. 1978), 1 mm; Abb. 10: Embryonalschale, Schletz (Fnr. 2525), 1 mm. – Abb. 11–12: *Planor-*
barius corneus; Abb. 11: Enzersdorf a. d. Fische (24. 7. 1983), 4 mm; Abb. 12: Stillfried (28. 3. 1982), 3 mm



Tafel VIII:

Abb. 1–2: *Planorbarius corneus grandis*; Kavala (13.–15. 8. 1983), 3 mm. – Abb. 3–4: *Planorbis planorbis*; Fischamend a. d. Donau (14. 2. 1982), 3 mm. – Abb. 5–6: *Planorbis carinatus*; Leesdorf, 3 mm. – Abb. 7–8: *Anisus spirorbis*; Lanzenkirchen (Fnr. 768), 2 mm. – Abb. 9–10: *Anisus septemgyratus*; Prellenkirchen (Obj. 655/Fnr. 323), 1 mm. – Abb. 11–12: *Anisus vorticulus*; Schletz (Fnr. 2871), 1 mm.



Tafel IX:

Abb. 1–4: *Gyraulus acronicus*; Abb. 1–2: Donau-Altarm b. Hütting (8. 9. 1985), 1 mm; Abb. 3–4: Gerasdorf (Probe 1), 2 mm. – Abb. 5–6: *Gyraulus albus*; Keutschacher See (Fnr. 53, zwischen Pfahl Nr. 24/27/28/30 u. 32), 2 mm. – Abb. 7–10: *Gyraulus laevis*; Abb. 7: Schletz (Fnr. 2525), 1 mm; Abb. 8: Stillfried (Qu. AB3, Verf. 14, Obj. 841, zw. Plan. 8 u. 9, Fnr. 13304/1986), 1 mm; Abb. 9–10: Lanzenkirchen (Fnr. 966), 1 mm. – Abb. 11–12: *Gyraulus crista*; Prellenkirchen (Obj. 1058, Fnr. 554), 1 mm. – Abb. 13–14: *Hippeutis complanatus*; Kritzendorfer Auen (1949), 1 mm.