

Tafel XXI:

Abb. 1–2: *Granaria frumentum*, inadult; Abb. 1: Schletz (Fnr. 2085), 1 mm; Abb. 2: Stillfried/Hausberg (Qu. 6, Abh. 4, Lfm. 8,5–9, 178,26–178,05 cm), 1 mm. – Abb. 3: *Granaria illyrica*; Gandria b. Lugano (15. 8. 1993), 2 mm. – Abb. 4–7: *Abida secale*; Abb. 4: Hinterbrühl, Schneckenkluft; Abb. 5: Ternitz (Sig. 180a/Fnr. 410); Abb. 6–7: Abri v. Elisabethen (Qu. 9hL1); alle: 1 mm. – Abb. 8: *Chondrina avenacea*; Ru. Liechtenstein (20. 9. 1953), 1 mm. – Abb. 9–13: *Chondrina arcadica clienta*; Abb. 9: Hinterbrühl, Schneckenkluft, 1 mm; Abb. 10–11: Nixloch (NL, K13A; 10: $\times 33$, 11: $\times 30$), 1 mm; Abb. 12–13: Ternitz (Sig. 180b/Fnr. 437), 2 mm.



Tafel XXII:

Abb. 1: *Columella edentula*; Lanzenkirchen (Sig. 45/Fnr. 965), 1 mm. – Abb. 2–3: *Columella columella*;
 Abb. 2: Hornsburg (Gra. I, Pr. 19); Abb. 3: Schletz (Fnr. 2888); beide: 1 mm. –
 Abb. 4–5: *Truncatellina cylindrica*; Abb. 4: Braunsberg (Fnr. 1705); Abb. 5: Schletz (Fnr. 2131); beide: 1 mm.
 – Abb. 6: *Truncatellina claustralis*; Braunsberg (Fnr. 1584), 1 mm
 Abb. 7–10: *Vertigo pusilla*; Abb. 7: Lanzenkirchen (Fnr. 810); Abb. 8 (Juvenilschale) u. Abb. 9: Abri v.
 Elsbethen (Qu. 8hM1); Abb. 10: Braunsberg (Fnr. 1640); alle: 1 mm. – Abb. 11–12: *Vertigo antivertigo*;
 Schletz (Abb. 11: Fnr. 2528; Abb. 12: Fnr. 2174); beide: 1 mm.




Tafel XXIII:

Abb. 1: *Vertigo antivertigo*; Rabendorf (23. 9. 1973), 1 mm. – Abb. 2–3: *Vertigo substriata*; Abb. 2: Abri v. Elsbethen [Qu. 19119kG3(6)]; Abb. 3: Namlos (10. 9. 1990); beide: 1 mm. – Abb. 4–6: *Vertigo pygmaea*: Abb. 4: Schletz (Fnr. 2368); Abb. 5–6: Lanzenkirchen (Fnr. 618); alle: 1 mm. – Abb. 7–8: *Vertigo modesta arctica*; Stillfried, Prof. II (Pr. 14, 20–40 cm oh. Bezugspunkt), 1 mm. – Abb. 9: *Vertigo parcedentata*; Willendorf i. d. Wachau (Pr. 16: KS 4), 1 mm. – Abb. 10: *Vertigo geyeri*; Lurgrotte (Gesiebe, Höhleninneres), 1 mm.



Tafel XXIV:

Abb. 1–2: *Vertigo alpestris*; Abb. 1: Gracarca (E1/88, Ostprofil, Kulturschicht), 1 mm; Abb. 2: Kleiner Pfaffenbach (9. 9. 1973), 1 mm. – Abb. 3–6: *Vertigo angustior*; Abb. 3: Schletz (Fnr. 2852); Abb. 4: Schletz (Fnr. 2888); Abb. 5–6: Rabendorf (23. 9. 1973); alle: 1 mm. – Abb. 7–12: *Chondrula tridens*; Abb. 7: Schletz (Fnr. 2745), 1 mm; Abb. 8: Mautern a. d. Donau/Favianis, Auxiliarkastell (Fnr. 96b0024), 2 mm; Abb. 9: Stillfried/Hausberg (Qu. 8, Abh. 5, Lfm. 8–8,5, 178,05–177,87 cm), 2 mm; Abb. 10: Mündung, Braunschweig (Fnr. 1723), 1 mm; Abb. 11–12: *albolimbata*, Slowakei, Spišský hrad (Naturhist. Museum Wien, coll. KLEMM, Nr. K63209, 9. 8. 1969), 2 mm.



Tafel XXV:

Abb. 1–2: *Chondrula bielzi*; Siebenbürgen, „Steinbruch“ (Naturhist. Museum Wien, coll. EDLAUER, Nr. 23896), 3 mm

Abb. 3–4: *Ena montana*; Abb. 3: Gracarca (W-Profil, G2/6), 3 mm; Abb. 4: Aufsicht des letzten Umganges mit charakteristischer Skulptur, Lanzenkirchen (Fnr. 618), 2 mm

Abb. 5–6: *Merdigera obscura*; Ternitz (Sig. 749/Fnr. 1898), 2 mm

Abb. 7–8: *Zebrina detrita*; Abb. 7: Bisamberg (3. 5. 1888), 5 mm; Abb. 8: Bisamberg (3. 5. 1888), 4 mm

Abb. 9–10: *Napaeopsis cephalonicus*; Kephalonien/Aenas (Naturhist. Museum Wien, leg. PAGANETTI, Nr. 51872), 2 mm

Abb. 11–14: *Cochlodina laminata*; Abb. 11–12: Hinterbrühl, Schneckenkluft, 2 mm; Abb. 13: Lanzenkirchen (Fnr. 618), 1 mm; Abb. 14: Braunsberg (Fnr. 1559), 1 mm.





Tafel XXVII:

Abb. 1–2: *Charpentieria ornata*; Tunnelhöhle (Schicht 22-1), 2 mm. – Abb. 3–4: *Pseudofusulus varians*; Badlgraben (25. 4. 1970), 2 mm. – Abb. 5–8: *Macrogastra ventricosa*; Abb. 5: Gracarca, W-Profil (G2/6), 3 mm; Abb. 6: Stranzendorf L, 2 mm; Abb. 7–8: Mündung bzw. Nacken, Abri v. Elsbethen [Qu. 19/20IG3(1)], 1 mm. – Abb. 9–10: *Macrogastra tumida*; Przemýsl/Polen (1973, Naturhist. Museum Wien, K65233, coll. KLEMM), 2 mm. – Abb. 11–12: *Macrogastra attenuata lineolata*; Rannatal zwischen Furt 6 und 7 (1995, leg. STORCH), 2 mm.



Tafel XXVIII:

Abb. 1: *Macrogastra badia*; Radlbergpass (1973), 2 mm. – Abb. 2–4: *Macrogastra densestriata*; Abb. 2: Paudorf (Neuaufnahme, Pr. 4), 2 mm; Abb. 3: Dobra (19. 5. 1996, leg. u. coll. STUMMER), 2 mm; Abb. 4: Gloggnitz (1969), 2 mm. – Abb. 5–8: *Macrogastra plicatula*; Abb. 5: Pointnergraben (1. 5. 1973), 32 mm; Abb. 6: Krems-Schießstätte (Pr. KR 4/2), 2 mm; Abb. 7: Almwüstung Plankenalm (Qu. A2, Obj.Nr. P-U 31), 5 mm; Abb. 8: Gracarca (W-Profil, G2/6), 1 mm. – Abb. 9–14: *Clausilia dubia*; Abb. 9–10: Abri v. Elsbethen (Qu. 8hL2), 2 mm; Abb. 11: Nixloch (NL 87, J/K 15A, $\times 14$), 1 mm; Abb. 12: Hinterbrühl, Schneckenkluft, 2 mm; zum Vergleich Abb. 13: Leopoldsberg (1990), 2 mm; und Abb. 14: Weißenburg (1953), 2 mm.



Tafel XXIX:

Abb. 1–12: *Clausilia dubia*; Abb. 1–3: Tropfsteinhöhle (1: Sch. 8+15, TH 299/2; 2: Sch. 6, TH 272/1; 3: Sch. 5, TH 253/1); Abb. 4–9: Tunnelhöhle (4: Sch. 17, TU 380; 5: Sch. 7g, TU 61; 6: Sch. 7, TU 60; 7: Sch. 7, TU 10; 8: Sch. 2, TU 475; 9: Sch. 2, TU 464); Abb. 10: Ruine Gösting (1970, „*gracilior*“); Abb. 11: Große Badlhöhle (Kleinsäugerschicht, BA 15); Abb. 12: Weites Maul (1992, leg. FREITAG, „*gobanzi*“); alle: 2 mm.